



•••••••••••••••• **Африканська чума свиней (АЧС)** яка перебігає блискавично, гостро, підгостро

АЧС – найнебезпечніша хвороба свиней, від якої не існує ліків і вакцин. Зараження нею свиней означає знищення всього поголів'я в епіцентрі інфекції, що відповідно призводить до непомірних збитків як для сільгосппідприємств, так і загалом для економіки країни.

Збудником АЧС є вірус, стійкий до широкого діапазону температур і кислотного середовища. У трупах свиней може зберігатися до десяти тижнів, у м'ясі та м'ясній продукції, одержаних від хворих тварин, – до 5 місяців, у гною – до 3 місяців, в ґрунті до 4 місяців, у воді озер – до 175 днів, в умовах холодильника – до 6 років.

До захворювання сприйнятливі свійські і дикі свині незалежно від віку.

Джерелом збудника інфекції є хворі і перехворілі свині-вірусоносії (до 2 і більше років). Із організму тварин вірус виділяється зі всіма секретами і екскретами, а також з видихуванним повітрям.

Факторами передачі збудника АЧС є різні інфіковані об'єкти зовнішнього середовища (транспорт, предмети одягу, фураж, вода, гній тощо). Люди, різні домашні і дикі тварини, птиця, гризуни, комахи (мухи, воші), які були в контакті з хворими і загиблими свинями чи знаходились на інфікованій території, можуть механічно переносити збудника.

За століття існування АЧС вченими не було винайдено методів її профілактики та лікування. Ускладнюється ситуація тим, що постійно проходить мутація вірусу.

З огляду на те, що біля наших кордонів протягом останніх 6 років постійно виявляються вогнища даного захворювання (Російська Федерація, Республіка Білорусь), існує вірогідність того, що АЧС може з'явитись і в Україні, оскільки швидкість розповсюдження хвороби природним шляхом з дикими кабанам та іншими тваринами становить близько 350 км за рік. У Росії на даний час вважається зараженою територія площею близько 700 тис. км. За останні роки було знищено більше 600 тис. гол. свиней.

Власникам тварин необхідно знати, що відповідно до Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней в епізоотичному вогнищі проводять наступні заходи:

- встановлюють карантин;

- встановлюють дві загрозові зони: перша – на глибину 10-20 км, друга на глибину до 150 км від епізоотичного вогнища;

- усіх свиней, що знаходяться в епізоотичному вогнищі, знищують безкровним методом; убитих і погнх свиней, гній, залишки кормів, тару і малоцінний інвентар, а також старі приміщення, дерев'яні поли, годівниці, перегородки, загорожі спалюють на місці;

- забороняється торгівля живими тваринами, свининою та іншими продуктами свинарства на ринках;

- забороняється введення і ввезення на карантинну територію, вивід і вивезення за її межі тварин усіх видів, у тому числі птахів;

- забороняється заготівля і вивезення продуктів і сировини тваринного походження;

- забороняється вивезення продукції рослинництва;

- на увесь час карантину обмежується в'їзд на карантинну територію і виїзд людей з цієї

території будь-яким видом транспорту.

Комплектування господарств поголів'ям свиней в колишньому епізоотичному вогнищі дозволяється тільки через рік після зняття карантину.

У зв'язку із загостренням епізоотичної ситуації щодо АЧС ще раз звертаємося до власників свиного господарств усіх форм власності та наголошуємо на безумовному виконанні заходів щодо недопущення проникнення збудника даного захворювання на територію нашого району.

Заходи профілактики включають:

1) керівники свиного господарств зобов'язані перевести свиного господарств на «закритий режим роботи», огородити тваринницькі об'єкти сіткою-рабіцею, іншою огорожею, яка унеможливіє та обмежує доступ на територію сторонніх осіб, тварин, транспорту; утримувати свиней в закритих приміщеннях, не допускати виходу, а також контакту з іншими тваринами і сторонніми особами;

2) облаштувати дезбар'єри на в'їздах-виїздах, облаштувати дезкилимки біля кожного входу (виходу) до тваринницьких приміщень, забезпечити обслуговуючий персонал

змінним спецодягом та взуттям, організувати його прання та дезінфекцію, організувати правильну роботу санпропускних систем при вході до тваринницьких об'єктів;

3) дотримуватися вимог технологічних карт, комплектувати поголів'ям з благополучних спеціалізованих свинарських господарств за наявності ветеринарних супровідних документів, дотримуватися обов'язкового профілактичного карантинування для завезених тварин (протягом 30 днів); завезення та переміщення свиней проводити тільки під контролем служби державної ветеринарної медицини; надавати поголів'я свиней для проведення клінічного огляду;

4) обумовити відсутність свиней в домашніх господарствах працівників свиноферм;

5) не ввозити на територію району тварин і продуктів забою, кормів, з неблагополучних та загрозливих щодо АЧС зон; не використовувати для годівлі свиней не проварені харчові відходи, забороняється використовувати боєнські відходи в корм свиням;

6) забій свиней проводити на спеціалізованих забійних пунктах з обов'язковим передзабійним ветеринарним оглядом та подальшим проведенням ветеринарно-санітарної експертизи; забороняється вимушений забій свиней;

7) проводити щеплення (проти класичної чуми свиней, бешихи) та інші ветеринарно-санітарні обробки у відповідності до затверджених технологічних карт та схем ветеринарних профілактичних заходів; регулярно обробляти свиней і приміщення для їх утримання від кровосисних комах, кліщів, а також регулярно знищувати гризунів;

8) негайно інформувати державну ветеринарну службу про усі випадки раптових змін клінічного стану домашніх свиней в особистих підсобних господарствах і кабанів в дикій природі за контактними телефонами:

– управління ветеринарної медицини – 2-19-73;

– державна лікарня ветеринарної медицини – 2-11-73.

Рекомендуємо власникам свиней сектору особистого користування населення переходити на альтернативні види тваринництва (вівчарство, кролівництво, птахівництво та ін.).

Ще раз звертаємося до жителів району:

Основними причинами поширення африканської чуми свиней (АЧС) в Російській Федерації та Республіці Білорусь стали безконтрольне переміщення хворих тварин, сировини і продукції тваринного походження, що містять збудника.

Тож для мінімізації загрози розповсюдження захворювання слід утримувати поголів'я свиней в закритому приміщенні, а не на подвір'ї, не згодовувати підозрілих кормів та харчових і боєнських відходів, не допускати контакту свиногоголів'я з іншими тваринами і сторонніми особами.

Головний державний інспектор

ветеринарної медицини

Новоукраїнського району

Н. Маковійчук